


Atussan syrop 1,5 mg/ml 150 ml (butelka)



Nasza cena: 22,50 pln

Opis słownikowy

Dawka	1,5 mg/ml
Opakowanie	150 ml (butelka)
Postać	syrop
Producent	POLFARMEX S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Butamiratum

Opis produktu

Nazwa: Atussan
Postać: syrop
Dawka: 1,5 mg/ml
Opakowanie: 150 ml (butelka)
Skład:

1 ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu.

5 ml syropu zawiera 7,5 mg butamiratu cytrynianu.

Substancje pomocnicze:

Sorbitol ciekły, niekryształizujący (1 ml syropu zawiera 450 mg sorbitolu).

Glicerol (1 ml syropu zawiera 250 mg glicerolu).

Wskazania:

Produkt leczniczy stosowany w leczeniu objawowym kaszlu różnego pochodzenia.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane:

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko ($\geq 1/10\ 000$ do

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko ($\geq 1/10\ 000$ do

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko ($\geq 1/10\ 000$ do

Dawkowanie:

Maksymalny czas trwania leczenia bez zalecenia lekarza wynosi 1 tydzień (patrz punkt 4.4).

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu (7,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu (15 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę. Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.

Dorośli: 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 4 razy na dobę.

Produkt leczniczy Atussan należy przyjmować przed posiłkiem.

Produktu leczniczego Atussan, 1,5 mg/ml, syrop nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.