

## Duphalac roztwór 300 ml



Nasza cena: 24,30 pln

### Opis słownikowy

Dawka	0,667 g/ml
Opakowanie	300 ml (butelka)
Postać	rozt.doust.
Producent	MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Lactulosum

### Opis produktu

**Nazwa:** Duphalac  
**Postać:** rozt.doust.  
**Dawka:** 0,667 g/ml  
**Opakowanie:** 300 ml (butelka)  
**Skład:**

- 15 ml preparatu zawiera : - 10 g laktulozy , - do 1,65 g galaktozy - i 0,9 g laktozy , - oraz śladowe ilości innych cukrów

#### Działanie:

- laktuloza dociera w niezmienionej postaci do jelita grubego , gdzie wstępnie ulega rozkładowi przez florę bakteryjną do kwasów organicznych. - doprowadza to do obniżenia pH kału , uruchomienia mechanizmów fermentacyjno - osmotycznych i do przyspieszenia perystaltyki jelita grubego . - laktuloza wpływa także wielokierunkowo na metabolizm amoniaku w ustroju

#### Wskazania:

##### Wskazania do stosowania:

- Zaparcia: regulacja fizjologicznej czynności okrężnicy
- Przypadki konieczności zmiękczenia stolca ze względów medycznych (żylaki odbytu, po operacjach w obrębie jelita grubego lub odbytu)
- Encefalopatia wątrobowa (EW): leczenie i zapobieganie śpiączce wątrobowej lub stanom przedśpiączkowym

#### Przeciwwskazania:

- duphalac nie jest wskazany dla pacjentów wymagających diety o niskiej zawartości galaktozy (zawiera galaktozę w ilości do 1,65 g/15

ml)

**Działania niepożądane:**

- niekiedy w początkowej fazie leczenia wzdęcia i gazy .Przy wysokich dawkach leku (np.w encefalopatii wątrobowej) lub przy nadużyciu leku biegunka z hypopotasemią

**Dawkowanie:**

Dawki dobowe należy dostosowywać indywidualnie. Poniższe informacje mają charakter orientacyjny:

Zaparcia lub przypadki konieczności zmiękczenia stolca ze względów medycznych

	Dawka początkowa	Dawka podtrzymująca
Dorośli	15-45 ml	15-30 ml
Dzieci (7-14 lat)	15 ml	10-15 ml
Dzieci (1-6 lat)	5-10 ml	5-10 ml
Niemowlęta	5 ml	5 ml

Z reguły dawki można zmniejszyć po kilku dniach, dostosowując je do potrzeb pacjenta.

Najkorzystniej jest przyjmować zaleconą dawkę leku jednorazowo w trakcie śniadania. Pierwsze efekty kliniczne mogą pojawić się dopiero po kilku dniach. Jest to związane z mechanizmem działania laktulozy. Można rozważyć zastosowanie większych dawek lub zwiększenie częstości podawania, jeżeli nie uzyska się pozytywnej odpowiedzi po pierwszych dwóch dniach.

**Śpiączka wątrobowa i stan przedśpiączkowy**

Dawka początkowa: 3 - 4 razy na dobę po 30-45 ml.

Dawka podtrzymująca: należy ją ustalić w taki sposób, aby pacjent oddawał luźny stolec 2-3 razy na

dobę. Odczyn stolca powinien zawierać się w granicach pH 5,0 - 5,5.

**Uwagi:**

- duphalac zawiera laktozę (do 0,9 g/15 ml) co powinno być brane pod uwagę przy leczeniu pacjentów z nietolerancją laktozy - w trakcie leczenia nie dopuszczać do wystąpienia biegunki - syrop rozpuszczać w wodzie lub innych płynach - zmiana koloru syropu nie wpływa na jego jakość