

## Enterosol płyn



Nasza cena: 13,95 pln

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	100 ml
Postać	płyn doustny
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Nazwa:** Enterosol  
**Postać:** płyn doustny  
**Dawka:** -  
**Opakowanie:** 100 ml  
**Skład:**

Substancję czynną leku stanowi wyciąg płynny złożony (0,5:1) z: kory dębu (*Quercus spp.*), kory wierzby (*Salix spp.*), ziela szawii (*Salvia officinalis L.*), ziela bylicy boże drzewko (*Artemisia abrotanum L.*), ziela tymianku (*Thymus spp.*), ziela krwawnika (*Achillea millefolium L.*) (2/2/2/2/1/1).

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70 % (V/V).

100 ml produktu leczniczego zawiera 100 ml substancji czynnej.

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi: 60-70 % (V/V).

**Działanie:** - leki ziołowe na stany zap.przewodu pokarmowego - enterosol - succus millefolii - tinctura calendulae - koszyczek rumianku - ziele krwawnika

**Wskazania:**

Enterosol jest produktem leczniczym roślinnym tradycyjnie stosowanym i jego skuteczność działania opiera się wyłącznie na doświadczeniu płynącym z długiego okresu stosowania leku.

Lek stosowany wspomagająco w niestrawności (wzdęcia, odbijanie) po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów.

**Przeciwwskazania:**

-uczulenie na którykolwiek ze składników produktu,

-uczulenie na rośliny z rodziny astrowatych (*Asteraceae*, dawniej *Compositae*) np. krwawnik, - aktywna choroba wrzodowa, - uczulenie na salicylany.

**Działania niepożądane:**

Nie stwierdzono dotychczas żadnych działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem leku Enterosol. Istnieje możliwość wystąpienia reakcji uczuleniowej u osób z nadwrażliwością na rumianek i krwawnik.

**Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych**

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309,

e-mail:ndl@urpl.gov.pl

**Interakcje:**

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

**Dawkowanie:****Dorośli**

Przyjmować doustnie 4 razy dziennie po 5 ml leku rozcieńczonego w niewielkiej ilości wody. Czas stosowania:

Stosować doraźnie w przypadku wystąpienia objawów.

**Środki ostrożności:**

Dawka jednorazowa – 5 ml zawiera do 2,8 g etanolu, co odpowiada ok. 30 ml wina i 72 ml piwa. Lek szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

Zawartość etanolu w preparacie należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub padaczką. Dzieci i młodzież:

Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży do 18 lat z powodu zawartości etanolu i braku wystarczających danych.

**Prowadzenie pojazdów:**

Brak danych na temat wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu. Bezpośrednio po zastosowaniu leku alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych bezpośrednio po przyjęciu preparatu. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu w okresie kuracji.

**Przedawkowanie:**

Nie zanotowano dotąd przypadków przedawkowania leku Enterosol. Objawy przedawkowania mogą być spowodowane wysoką zawartością etanolu w produkcie.

**Ciąża:**

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią oraz wpływu leku na płodność. Z powodu braku wystarczających danych i ze względu na zawartość etanolu nie stosować leku w ciąży i podczas laktacji.

