

Gardimax Medica tabletki do ssania 24 szt

Nasza cena: 22,50 pln



Opis słownikowy

Dawka	5mg+1mg
Opakowanie	24 tabl. (2 blist.po 12 szt.)
Postać	tabl.do ssania
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Chlorhexidini dihydrochloridum, Lidocaini hydrochloridum

Opis produktu

Nazwa: Gardimax Medica

Postać: tabl.do ssania

Dawka: 5mg+1mg

Opakowanie: 24 tabl. (2 blist.po 12 szt.)

Skład:

1 tabletkę do ssania zawiera: 5 mg dichlorowodorek chlorheksydyny (*Chlorhexidini dihydrochloridum*) + 1 mg chlorowodorek lidokainy (*Lidocaini hydrochloridum*). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wskazania:

Lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania:

lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-- Po długotrwałym stosowaniu chlorheksydyny mogą pojawić się brązowe przebarwienia na zębach. Przebarwienia te można usunąć.

Interakcje:

Z uwagi na możliwe interakcje, należy unikać stosowania antyseptyków. Należy unikać stosowania połączenia środków znieczulających miejscowo i inhibitorów cholinoesterazy.

Chlorowodorek lidokainy może zwiększyć stężenie methemoglobiny we krwi u pacjentów otrzymujących jednocześnie inne leki wpływające na jej powstawanie, np. sulfonamidy. Cymetydyna, leki beta-adrenolityczne, norepinefryna, anestetyki wziewne hamują metabolizm lidokainy poprzez zmniejszenie przepływu wątrobowego, prowadząc do zwiększenia stężenia leku w surowicy.

Barbiturany, ryfampicyna, fenytoina przyspieszają- Należy ograniczyć stosowanie tego produktu do przypadków kiedy złagodzenie występującego bólu i podrażnienia jest absolutnie konieczne. Produktu nie należy stosować długotrwale. Nie należy ssać jedną tabletkę bezpośrednio po drugiej.

- W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki (powyżej 20 tabletek na dobę) istnieje ryzyko wystąpienia zbyt dużej utraty wrażliwości w obszarze głośni, powodującej zmniejszenie kontroli odruchu połykania i zwiększenie ryzyka zachłyśnięcia.

przyjmowania pokarmów i napojów bezpośrednio po zastosowaniu produktu leczniczego. Ze względu na zmniejszoną jamy ustnej oraz gardła, spowodowanych przyjmowaniem zbyt gorących napojów oraz pokarmów.

- niepokój, ziewanie, nerwowość, szumy uszne, oczopląs, drżenie mięśni, drgawki, depresja, niewydolność oddechowa.