

HEEL Neurexan tabl. 50 tabl.



Nasza cena: 31,95 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	50 tabl.
Postać	tabl.
Producent	BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH
Rejestracja	Lek homeopatyczny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Nazwa: HEEL Neurexan
Postać: tabl.
Dawka: -
Opakowanie: 50 tabl.
Skład:

1 tabletkę zawiera następujące substancje czynne:

1.Passiflora incarnata	D2	0,6 mg
2.Avena sativa	D2	0,6 mg
3.Coffea arabica	D12	0,6 mg
4.Zincum isovalerianicum	D4	0,6 mg

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Pełna lista substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Wskazania:

Homeopatyczny produkt leczniczy stosowany w zaburzeniach snu i stanach wzmożonego napięcia nerwowego.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Działania niepożądane:

Działania niepożądane mogą pojawić się z następującą częstotliwością:

bardzo rzadkie , występują mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów – skórne reakcje alergiczne

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Lecniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.:+48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl).

Interakcje:

Nie są znane.

Dawkowanie:

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież od 12 lat :

1 tabletką 3 razy dziennie.

Początkowo, w nasilonych objawach można stosować po

1 tabletkę co ½ godziny – 1 godzinę. Nie należy przekraczać dawki 12 tabletek na dobę. Następnie należy kontynuować leczenie zwykle zalecaną dawką.

Dzieci poniżej 12 lat :

Dzieci poniżej 2 lat:

Sposób podawania:

Tabletki należy przyjmować na co najmniej 30 minut przed posiłkiem. Należy rozpuścić tabletkę w ustach przed połyknięciem. W przypadku podawania leku dziecku, szczególnie poniżej 6 lat, zaleca się rozkruszyć tabletkę i rozpuścić w niewielkiej ilości wody, aby nie doszło do zakrztuszenia.

Środki ostrożności:

Lek zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Dzieci:

U dzieci poniżej 12 lat lek może być stosowany według wskazań lekarza. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.

Prowadzenie pojazdów:

Nie przeprowadzono badań ani nie zanotowano żadnych zgłoszeń dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Pacjenci cierpiący na zaburzenia snu powinni wziąć pod uwagę, że ta dolegliwość może upośledzać ich zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Nie powinni więc wykonywać tych czynności.

Przedawkowanie:

Brak doniesień o przedawkowaniu produktu.

Ciąża:

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego w czasie ciąży i/lub laktacji.

Brak jest doniesień o toksycznym działaniu homeopatycznych rozcieńczeń substancji czynnych zawartych w tym leku w czasie ciąży i/lub laktacji.

Do tej pory nie zanotowano zgłoszeń dotyczących działań niepożądanych.