

## Hemorigen tabletki 0,05g 30 szt



Nasza cena: 17,01 pln

### Opis słownikowy

Dawka	0,05 g
Opakowanie	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Postać	tabl.
Producent	WROCLAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Erigeronis canadense extractum

### Opis produktu

**Nazwa:** Hemorigen

**Postać:** tabl.

**Dawka:** 0,05 g

**Opakowanie:** 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

**Skład:**

#### SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletkę zawiera 50 mg wyciągu gęstego z ziela przymiotna kanadyjskiego ( Erigeroni canadensis herbae extractum spissum) DER 30-40:1, ekstrahent - etanol 96 % v/v

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

#### Wskazania:

Lek stosowany tradycyjnie we wspomagającym leczeniu drobnych stłuczeń i podbiegnięć krwawych (siniaków) powstałych w wyniku łagodnych urazów.

#### Przeciwwskazania:

Z uwagi na nieznaną mechanizm działania Hemorigenu nie zaleca się stosowania go u pacjentów z zakrzepicą i osób z chorobą zakrzepową żył.

Osoby z żylakami, żylakami odbytu oraz przewlekłą niewydolnością żylną mogą stosować lek wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Nie należy stosować Hemorigenu przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

**Działania niepożądane:**

W czasie stosowania Hemorigenu nie zaobserwowano objawów niepożądanych.

**Interakcje:**

Nie są znane.

**Dawkowanie:**

Dorośli: doustnie - 3 razy dziennie po 1-2 tabletki, nie dłużej niż 3 - 4 dni

**Środki ostrożności:**

Z uwagi na przynależność przymiotna do rodziny Złożonych (Asteraceae, Compositae) u chorych z uczuleniem na pyłki roślin z tej rodziny, Hemorigen należy stosować ostrożnie.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

**Prowadzenie pojazdów:**

Hemorigen nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

**Przedawkowanie:**

Brak danych.

**Ciąża:**

Nie jest znany wpływ leku na zdrowie matki i dziecka w okresie ciąży i karmienia piersią.