

Hemorol czopki 12 szt



Nasza cena: 24,30 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	12 czop. (2x6szt.)
Postać	czop.doodbyt.
Producent	WROCLAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek ziółowy
Substancja czynna	Produkt złożony

Opis produktu

Nazwa: Hemorol

Postać: czop.doodbyt.

Dawka: -

Opakowanie: 12 czop. (2x6szt.)

Skład:

Matricariae extractum spissum (3:1); ekstrahent woda oczyszczona 50 mg

Belladonnae radice extractum spissum (4:1); ekstrahent etanol 70% V/V 20 mg

Extractum compositum spissum (4:1) ex: Cytisi scoparii herba,

Hippocastani cortice, Tormentillae rhizomate, Millefolii herba;

ekstrahent etanol 40% V/V 80 mg

Benzocainum 100 mg

Działanie:

- przeciwozłonkowo - przeciwzapalne - przeciwkrwotoczne - spazmolityczne - poprawia krążenie żyłne

Wskazania:

Lek stosowany tradycyjnie w dolegliwościach towarzyszących zylakom odbytu. Stosowany także w przewlekłych stanach zapalnych błony śluzowej odbytu oraz podrażnieniach i pęknięciach śluzówki odbytu.

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim

okresie stosowania i doświadczeniu.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na składniki leku

Interakcje:

Nie są znane.

Dawkowanie (dorośli):

- doodbytniczo 1 czopek na noc - w przypadkach cięższych 2-3 czopków w ciągu dnia

Dawkowanie (dzieci):

powyżej 6 roku życia doodbytniczo 1 czopek na noc

Środki ostrożności:

Przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku stwierdzenia krwi w stolcu należy zasięgnąć porady lekarza.

Ze względu na działanie uczulające benzokainy zaleca się przeprowadzenie wywiadu w kierunku skłonności do uczuleń pacjenta oraz nie przekraczanie 7 dni stosowania produktu. W przypadku braku działania lub zaostrzenia objawów chorobowych należy przerwać stosowanie produktu.

W przypadku dużych guzków krwawniczych może wystąpić uciskowa bolesność do czasu rozpuszczenia się czopka (ok. 5-10 min). Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u dzieci.

Ciąża:

Ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia działania poronnego (wyciąg z żarnowca, escyna) preparat nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży. Nie badano bezpieczeństwa leku u kobiet karmiących piersią.