

Herbapect syrop 240 g



Nasza cena: 21,60 pln

Opis słownikowy

Dawka	(0,498g+0,348g+0,087g)/5ml
Opakowanie	240 g
Postać	syrop
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Thymi extractum fluidum, Primula officinalis, Sulfoguaiacolum

Opis produktu

Nazwa: Herbapect

Postać: syrop

Dawka: (0,498g+0,348g+0,087g)/5ml

Opakowanie: 240 g

Skład:

5 ml syropu zawiera substancje czynne:

498 mg wyciągu płynnego z *Thymus vulgaris* L., (herba) ziele tymianku (1:2), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 30% (V/V), woda amoniakalna 25%, glicerol 95%;

349 mg nalewki z *Primula veris* L., (radix) korzeń pierwiosnka lekarskiego (1:5), rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 70% (V/V); 87 mg sulfogwajakolu (*Sulfoguaiacolum*).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol ciekły, niekryształizujący. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Produkt leczniczy zawiera 6,4 - 9,0% (V/V) etanolu.

Wskazania:

Tradycyjnie w niezżytach górnych dróg oddechowych.

Męczący tzw. "suchy kaszel". Utrudnione odkrztuszenie.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Astma.

Nie należy stosować u dzieci, które chorowały na ostre zapalenie krtani (krup).

Działania niepożądane:

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, są wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów.

Ze względu na zawartość zieleń tyminianki istnieje możliwość wystąpienia reakcji alergicznej (wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quincke)).

Zaburzenia żołądka i jelit:

- nudności, wymioty.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Interakcje:

Brak danych.

Dawkowanie:

Dawkowanie

Dorośli: 5 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę, po posiłku.

Dzieci powyżej 4 lat i młodzież do 18 lat: 2,5 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę po posiłku, nie częściej niż co 4 godziny.

Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie, za pomocą której należy odmierzać produkt leczniczy.

Dzieci

Produktu leczniczego nie zaleca się stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Maksymalna dawka dobową

Nie należy przyjmować więcej niż 20 ml syropu na dobę. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Czas trwania leczenia

Produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 7 dni.

Środki ostrożności:

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych Lek zawiera 6,4 - 9,0% (V/V) etanolu.

Dawka 2,5 ml syropu zawiera 189,4mg etanolu 96% (V/V), co jest równoważne 4,5 ml piwa i 1,9 ml wina.

Dawka 5 ml syropu zawiera 378,8mg etanolu 96% (V/V), co jest równoważne 9,0 ml piwa i 3,8 ml wina.

Stosowanie produktu jest szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Zawartość alkoholu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u dzieci i młodzieży oraz u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Produkt leczniczy zawiera sorbitol, dlatego nie należy stosować go u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Syrop nie zawiera cukru i może być stosowany przez diabetyków.

Dawka 5 ml syropu zawiera 3,73 g czystego sorbitolu, czyli 0,373 ww.

Dawka 2,5 ml syropu zawiera 1,865 g czystego sorbitolu, czyli 0,1865 ww.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Prowadzenie pojazdów:

Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przedawkowanie:

Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania, w razie wystąpienia należy zastosować leczenie objawowe.

Ciąża:

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu, nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Płodność Brak danych.