

Krople Żołądkowe z Papaweryną 35 ml



Nasza cena: 8,01 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	35 ml
Postać	krop.doustne
Producent	KRAKOWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" W KRAKOWIE S.A.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Nazwa: Krople Żołądkowe z Papaweryną -Fortestomachicae

Postać: płyn doustny

Dawka: -

Opakowanie: 35 ml

Skład:

Dawkowanie

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania u osób dorosłych:

W niestrawności doustnie jednorazowo ok. 2,5 ml, co odpowiada $\frac{1}{2}$ łyżeczki preparatu w $\frac{1}{4}$ szklanki wody lub na cukier, w przypadku wystąpienia dolegliwości.

W przypadku braku łaknienia ok. 2,5 ml, co odpowiada $\frac{1}{2}$ łyżeczki preparatu w $\frac{1}{4}$ szklanki wody lub na cukier, 30 min. przed jedzeniem 3 - 4 x dziennie.

Sposób podawania

Lek przeznaczony jest do podawania doustnego.

Czas stosowania

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie (14 dni), pomimo stosowania produktu, należy zasięgnąć porady lekarza.

Środki ostrożności:

Dawka jednorazowa leku zawiera 1,38 g etanolu co odpowiada 35 ml piwa lub 14,6 ml wina. Nie podawać osobom cierpiącym na choroby wątroby, padaczkę, alkoholizm.

Nalewka z dziurawca może powodować wystąpienie reakcji fotoalergiczej, dlatego podczas leczenia należy unikać ekspozycji na promieniowanie UV (opalanie, solarium).

Nalewka z liści mięty pieprzowej u pacjentów z refluksem żołądkowo – przełykowym może powodować nasilenie zgagi. Nie stosować u pacjentów z kamieniami żółciowymi i zaburzeniami dróg żółciowych.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Prowadzenie pojazdów:

Preparat może wpływać na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu. Z tego względu preparatu nie należy stosować przed prowadzeniem pojazdu. Ponadto alkohol zawarty w produkcie może zostać wykryty w powietrzu wydychanym.

Przedawkowanie:

Nie zgłaszano przypadków przedawkowania tego produktu.

Ze względu na zawartość nalewki z ziela dziurawca po przedawkowaniu produktu należy unikać promieni słonecznych i promieniowania UV (solarium).

Ciąża:

Ze względu na zawartość etanolu oraz brak danych potwierdzających bezpieczeństwo nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Brak danych dotyczących wpływu na płodność.