

Lactulosum Polfarmex syrop 150 ml



Nasza cena: 12,60 pln

Opis słownikowy

Dawka	7,5 g/15ml
Opakowanie	150 ml
Postać	syrop
Producent	POLFARMEX S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Lactulosum

Opis produktu

Nazwa: Lactulosum Polfarmex

Postać: syrop

Dawka: 7,5 g/15ml

Opakowanie: 150 ml

Skład:

15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy (*Lactulosum*) oraz substancje pomocnicze.

Wskazania:

- przewlekłe zaparcia,
- ostra niewydolność wątroby ze stanami przedśpiączkowymi i śpiączka,
- przewlekła niewydolność wątroby przebiegająca z podwyższeniem stężenia amoniaku we krwi.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancję czynną i (lub) którykolwiek składnik preparatu,
- niedrożność jelit,
- galaktozemia.

Działania niepożądane:

W początkowym okresie stosowania mogą wystąpić bóle brzucha. Niekiedy po zastosowaniu dużych dawek obserwuje się nudności, biegunkę, wzdęcia.

Dawkowanie:

przecyszczająco:

doustnie, zazwyczaj 30-45 ml (2-3 łyżki stołowe) przed śniadaniem lub po 15 ml (1 łyżka) 3 razy na dobę przed posiłkami. Po uzyskaniu efektu - 15 ml syropu na czczo.

w niewydolności wątroby:

doustnie, 100-180 ml na dobę w 4-6 dawkach.

dzieci

przecyszczająco:

początkowo, niemowlęta - 2,5 ml, dzieci do lat 3-5 ml, powyżej 3 lat – 15 ml na dobę. Następnie dawkę leku można stopniowo zwiększać co 3 dni, aż do uzyskania prawidłowych wypróżnień.

Jeżeli wystąpią wzdęcia brzucha, należy zmniejszyć dawkę do tolerowanej przez dziecko.

Zaleca się podawanie syropu z laktulozą po rozcieńczeniu wodą lub sokiem owocowym.