

Maść nagietkowa 25 g



Nasza cena: 18,00 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	25 g
Postać	-
Producent	WYTWARZANIE ART.KOSM.I PERF."ELISSA" MGR IRENA OCIOŚZYŃSKA
Rejestracja	
Substancja czynna	Calendulae flos

Opis produktu

Nazwa: Maść nagietkowa
Postać: maść
Dawka: -
Opakowanie: 25 g
Skład:

Maść zawiera ekstrakt z *Calendula officinalis L., Calendula flower (Calendula flos)*,

Ekstrahent: etanol oraz wazelina biała

Wskazania:

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

W leczeniu łagodnych stanów zapalnych skóry, pomocniczo do gojenia niewielkich zranień.

Przeciwwskazania:

Uczulenie na nagietek lub inne rośliny z rodziny Złożonych (Compositae = Asteraceae).

Nie stosować na otwarte rany i znacznie uszkodzoną skórę..

Działania niepożądane:

Mogą wystąpić odczyny alergiczne skóry (np. alergia kontaktowa).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Interakcje:

Nie znane

Dawkowanie:

Dawkowanie: Dorośli: smarować 2 - 4 razy dziennie zmienione chorobowo powierzchnie skóry.

Sposób podawania: podanie na skórę

Środki ostrożności:

W przypadku wystąpienia wyprysków, pęcherzyków lub innych objawów stanu zapalnego skóry należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów:

Maść nagietkowa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn .

Przedawkowanie:

W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie stosować w stanach zapalnych brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią.