

## Maść ochronna z witaminą A



Nasza cena: 4,95 pln

### Opis słownikowy

Dawka	800 j.m./g
Opakowanie	25 g
Postać	-
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Retinolum

### Opis produktu

**Nazwa:** Maść ochronna z witaminą A

**Postać:** maść

**Dawka:** 800 j.m./g

**Opakowanie:** 25 g

**Skład:**

Jeden gram maści zawiera:

witamina A (*Retinoli palmitas*) 800 j.m.

Substancje pomocnicze - patrz punkt 6.1.

#### Działanie:

Maść z witaminą A jest do stosowania zewnętrznego. Witamina A jest niezbędnym czynnikiem dla prawidłowego funkcjonowania błon śluzowych i skóry. Maść działa osłaniająco, regeneruje naskórek i zmniejsza jego rogowacenie oraz łagodzi stany zapalne skóry i przyspiesza gojenie się ran.

#### Wskazania:

Oslaniająco w celu regeneracji naskórka, zmniejszenia rogowacenia, złagodzenia stanów zapalnych. Ochronnie przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych.

#### Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną (witaminę A, palmitynian retynolu) albo na pozostałe składniki produktu.

Podczas leczenia nie stosować kosmetyków o działaniu wysuszającym i ściągającym.

**Działania niepożądane:**

Witamina A podawana zgodnie ze wskazaniami jest na ogół dobrze tolerowana i nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Znane przypadki wystąpienia działań niepożądanych dotyczą wyłącznie doustnego lub parenteralnego przyjmowania witaminy A.

**Interakcje:**

Nie są znane interakcje wynikające z miejscowego i krótkotrwałego zastosowania maści zawierającej witaminę A. Znane przypadki interakcji dotyczą wyłącznie doustnego lub parenteralnego podawania witaminy A.

**Dawkowanie:**Dawkowanie

1 do 2 razy na dobę smarować maścią chorobowo zmienioną powierzchnię skóry. W stanach ostrych maść można stosować kilka razy na dobę. Ochronnie nałożyć cienką warstwę maści na powierzchnię skóry narażoną na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych.

Sposób podawania

Produkt stosuje się na skórę.

**Środki ostrożności:**

Nie stosować na błony śluzowe. Należy chronić oczy przed kontaktem z produktem.

**Prowadzenie pojazdów:**

Produkt nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

**Przedawkowanie:**

Znane przypadki przedawkowania witaminy A (hiperwitaminoza A) dotyczą wyłącznie jej doustnego lub parenteralnego podawania.

Objawami hiperwitaminozy A są: uczucie zmęczenia, drażliwości, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (m.in. nudności, wymioty, brak łaknienia), zmiany zabarwienia skóry, hiperkeratoza, niedokrwiistość, bóle głowy, podwyższenie poziomu wapnia w osoczu krwi, obrzęki tkanki podskórnej, bóle kostno-stawowe oraz podwyższenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

**Ciąża:**

Nie przeprowadzono badań dotyczących działania teratogennego produktu leczniczego.

Produkt może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.