

Neo-Aesculan żel doodbytniczy

Nasza cena: 26,10 pln



Opis słownikowy

Dawka	(0,05g+5mg)/g
Opakowanie	30 g
Postać	żel doodbyt.
Producent	POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Hippocastani corticis extractum siccum, Lidocainum hydrochloridum

Opis produktu

Nazwa: Neo-Aesculan
Postać: żel doodbyt.
Dawka: (0,04g+5mg)/g
Opakowanie: 30 g
Skład:

1 g żelu zawiera substancje czynne:

- 50 mg wyciągu (w postaci suchego wyciągu) z *Aesculus hippocastanum* L., cortex (kora kasztanowca) (40-90:1).

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: metanol 90 % (v/v).

- 5 mg lidokainy chlorowodoru (*Lidocaini hydrochloridum*).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Działanie: Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania:

Wskazaniem do stosowania jest choroba hemoroidalna.

Produkt leczniczy wskazany jest do stosowania u dorosłych.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować preparatu Neo-Aesculan, jeśli występuje nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, uczulenie na amidowe środki miejscowo znieczulające i/lub na rośliny z rodziny *Asteraceae*.

Działania niepożądane:

Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych żelu Neo-Aesculan. Użycie miejscowe preparatów z lidokainą może powodować sporadycznie wystąpienie reakcji uczuleniowej, rzadko wstrząs anafilaktyczny. Balsam peruwiański, olejek rumiankowy i etylu parahydroksybenzoesan mogą powodować wystąpienie reakcji alergicznej (może być spóźniona). Bronopol może wywoływać miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe).

Interakcje:

Nie zaleca się równoczesnego stosowania doodbytniczo innych produktów leczniczych miejscowo znieczulających.

Istnieje teoretyczne ryzyko nasilenia działania preparatów przeciwzakrzepowych przy równoczesnym stosowaniu wyciągu z kasztanowca. Brak bezpośrednich dowodów eksperymentalnych lub klinicznych. Zaleca się, aby pacjenci stosujący wyciąg z kasztanowca równocześnie z preparatami przeciwzakrzepowymi, np. warfaryną, dokładnie obserwowali występujące objawy w celu wykrycia ewentualnych oznak nasilonego krwawienia. Brak doniesień o przypadkach klinicznych.

Dawkowanie:Dawkowanie

Dorośli: o ile lekarz nie zaleci inaczej, należy za pomocą załączonej kaniuli nałożyć żel na chore miejsce lub wcisnąć do odbytnicy ok. 0,5 - 1,0 g (pasma żelu o długości ok. 2 cm), 2 - 3 razy dziennie, aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując żel raz na dobę. Preparat należy stosować do ustąpienia objawów.

Jeżeli po 7 dniach stosowania preparatu nie ma poprawy lub gdy nastąpi zaostrzenie dolegliwości związanych z chorobą hemoroidalną, należy skontaktować się z lekarzem.

Sposób podawania

Podanie doodbytnicze.

Należy umyć ręce po każdorazowym zastosowaniu produktu.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u dzieci. W związku z tym nie zaleca się stosowania produktu u osób poniżej 18 roku życia.

Środki ostrożności:

W przypadku wystąpienia nasilonego krwawienia z odbytu, krwi w stolcu lub silnych dolegliwości bólowych należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów:

Brak danych na temat wpływu stosowania produktu leczniczego Neo-Aesculan na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przedawkowanie:

Brak danych.

Ciąża:

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w ciąży i w okresie laktacji. W związku z tym nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w tym okresie.

Uwagi: Nazwa międzynarodowa/skład : Hippocastani corticis extractum siccum +Lidocaini hydrochloridum .Dawka : (50mg+5mg)/g