

Neo-Angin tabletki do ssania 24 szt



Nasza cena: 22,50 pln

Opis słownikowy

Dawka	1,2mg+0,6mg+5,9mg
Opakowanie	24 tabl.
Postać	tabl.do ssania
Producent	DIVAPHARMA GMBH
Rejestracja	
Substancja czynna	Alcohol dichlorobenzylum, Amylmetacresolum, Levomentholum

Opis produktu

Nazwa: Neo-Angin
Postać: tabl.do ssania
Dawka: 1,2mg+0,6mg+5,9mg
Opakowanie: 24 tabl.
Skład:

Jedna tabletki do ssania zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego (*Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus*), 0,6 mg amyloetakrezolu (*Amylmetacresolum*) i 5,9 mg lewomentolu (*Levomentholum*).

Substancje pomocnicze:

Jedna tabletki zawiera 1,14 g glukozy oraz 1,42 g sacharozy (patrz także punkt 4.3 i 4.4). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wskazania:

Produkt Neo-angin jest zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Nietolerancja fruktozy.

Zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niedobór sacharazy-izomaltazy.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane:

Działania niepożądane wymieniono poniżej według częstości występowania. Częstość występowania

określa się następująco:

Bardzo często (> =1/10)

Często (> =1/100 do 1

Niezbyt często (> =1/1 000 do

Rzadko (> =1/10 000 do

Bardzo rzadko (

Po podaniu produktu Neo-angin obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo rzadko (

Mogą również wystąpić reakcje alergiczne.

Interakcje:

Dotychczas nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji z innymi lekami podawanymi doustnie.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

Powoli ssać lub rozpuszczać w jamie ustnej 1 tabletkę co 2-3 godziny.

Nie należy połykać tabletek w całości. Nie żuć.

Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek w ciągu doby.

Pacjent nie powinien przyjmować produktu dłużej niż 4-5 dni bez zalecenia lekarza. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Środki ostrożności:

Neo-angin zawiera czerwień koszenilową (E 124), która może powodować reakcje alergiczne. Jedna tabletkę zawiera 1,14 g glukozy oraz 1,42 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Pacjenci z rzadkimi zaburzeniami związanymi z nietolerancją glukozy, nie powinni przyjmować produktu.

Prowadzenie pojazdów:

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przedawkowanie:

Nie odnotowano przypadków przedawkowania produktu. W przypadku zażycia znacznie większej dawki leku niż zalecana może wystąpić podrażnienie błony śluzowej żołądka i jelit. W takim przypadku zaleca się leczenie objawowe.

Ciąża:

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania produktu u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach

nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Ze względu na niewystarczające dane niemożliwe jest dokładne określenie potencjalnego ryzyka dla płodu, dlatego kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem produktu. Należy zachować ostrożność zalecając lek kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.