

Neo-Capsiderm maść 30 g



Nasza cena: 16,11 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 g
Postać	maść
Producent	POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	-

Opis produktu

Nazwa: Neo-Capsiderm

Postać: maść

Dawka: -

Opakowanie: 30 g

Skład:

100 g maści zawiera: *Nonivamidum* - 0,05 g, *Camphora* - 5,3 g, *Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro* - 9,7 g, *Eucalypti aetheroleum* - 2,5 g.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1.

Działanie: Działa drażniąco na skórę, wywołuje jej przekrwienie i zaczerwienienie, działa rozgrzewająco. Rozszerzenie naczyń krwionośnych powoduje lepsze ukrwienie obolałego miejsca i szybsze ustępowanie obrzęków i stanów zapalnych. W wyniku ustępowania stanu zapalnego stopniowo ustępują dolegliwości bólowe.

Wskazania:

Neo-Capsiderm stosowany jest jako środek rozgrzewający w bólach mięśniowych (naciągnięcia, bolesne skurcze mięśni), pomocniczo w bólach przy stanach zapalnych stawów oraz w nerwobólach (zapalenie korzonków nerwowych, rwa kulszowa).

Przeciwwskazania:

Uszkodzona skóra, nadwrażliwość na noniwamid lub przetwory z pieprzowca lub na pozostałe składniki produktu.

Nie należy stosować u dzieci.

Działania niepożądane:

W niektórych przypadkach mogą wystąpić odczynu uczuleniowe (wykwit pokrzywkowy).

W przypadku utrzymywania się odczynu uczuleniowego, po zaprzestaniu stosowania produktu, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Interakcje:

Brak danych.

Dawkowanie:

Stosować zewnętrznie na skórę.

Dorośli: niewielką ilość maści delikatnie wmasować w bolące miejsca 1 – 2 razy dziennie.

Odstępy między kolejnymi aplikacjami maści powinny być nie mniejsze niż 4 godziny. Stosować nie dłużej niż przez okres 2 dni. Po nałożeniu leku należy dokładnie umyć dłonie wodą z mydłem, zmywając pozostałości maści. W trakcie nanoszenia produktu bezwzględnie unikać kontaktu z oczami oraz błonami śluzowymi. Nie stosować na uszkodzoną skórę. Przerwa przed ponownym zastosowaniem na to samo miejsce musi wynosić przynajmniej 14 dni.

Uwaga: przy dłuższym stosowaniu w tym samym miejscu może nastąpić uszkodzenie nerwów czuciowych.

Dawkowanie (dorośli): - odpowiednie miejsce zmyć wilgotnym wacikiem, rozsmarować maść na miejsce dotkniętym schorzeniem 1 - 2 razy dziennie, następnie przykryć

Dawkowanie (dzieci): - maść stosować po rozcieńczeniu 1cz. preparatu z 3 - 5 cz. wazeliny

Środki ostrożności:

- nie stosować na uszkodzoną skórę;
- w przypadku wystąpienia objawów uczulenia charakteryzujących się powstaniem wysięków lub wysypki, należy niezwłocznie zaprzestać stosowania;
- na początku terapii można odczuwać mrowienie, pieczenie;
- po nałożeniu produktu należy dokładnie umyć dłonie wodą z mydłem, zmywając pozostały na dłoniach produkt;
- w żadnym wypadku nie należy brać gorącej kąpieli przed lub po nałożeniu produktu, gdyż może to pogłębić odczucie mrowienia, pieczenia;
- lanolina może wywołać miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe);
- w przypadku dłużej utrzymującego się rumienia lub wystąpienia obrzęku należy przerwać stosowanie produktu, zaleca się przemyć skórę wodą utlenioną.

Prowadzenie pojazdów:

Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

Przedawkowanie:

Przedawkowanie produktu Neo-Capsiderm może wywołać podrażnienie skóry.

Niewłaściwe użycie

Przypadkowe połknięcie maści Neo-Capsiderm może wywołać dolegliwości żołądkowo-jelitowe takie jak wymioty i biegunka. Należy zastosować leczenie objawowe.

Ostre zatrucia z nudnościami, wymiotami, bólem brzucha i głowy, zawrotami głowy, uczuciem i uderzeniami gorąca, konwulsjami, trudnościami w oddychaniu i śpiączką obserwowano po znaczącym przypadkowym spożyciu,

Pacjenci z ciężkimi żołądkowo-jelitowymi lub neurologicznymi objawami zatrucia powinni być obserwowani i leczeni objawowo. Nie

należy wywoływać wymiotów.

Ciąża:

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie stosować produktu w czasie ciąży oraz w czasie karmienia piersią.

Brak badań oraz doniesień literaturowych wykazujących wpływ poszczególnych składników maści Neo-Capsiderm na płodność.