

## Polfungicid płyn 10 ml



Nasza cena: 53,10 pln

### Opis słownikowy

Dawka	(0,05g+0,01g)/ml
Opakowanie	10 ml
Postać	płyn do stos.na skórę
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Chlormidazoli hydrochloridum, Acidum salicylicum

### Opis produktu

**Nazwa:** Polfungicid  
**Postać:** płyn do stos.na skórę  
**Dawka:** (0,05g+0,01g)/ml  
**Opakowanie:** 10 ml  
**Skład:**

1 ml produktu zawiera 50 mg chlormidazolu chlorowodoru (*Chlormidazoli hydrochloridum*) i 10 mg kwasu salicylowego (*Acidum salicylicum*).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

#### Wskazania:

Grzybicze i bakteryjne zakażenia paznokci i skóry - grzybice międzypalcowe, a szczególnie przypaznokciowe.

#### Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

#### Działania niepożądane:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: miejscowe objawy podrażnienia skóry - zaczerwienienie, pieczenie lub swędzenie skóry (częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych); w razie ich wystąpienia należy przerwać stosowanie produktu.

#### Interakcje:

Kwas salicylowy może zmieniać przepuszczalność skóry dla innych stosowanych jednocześnie substancji, kosmetyków itp.

**Dawkowanie:**

Miejscowo: zmienioną chorobowo okolicę należy pędzlować roztworem 2 ? 3 razy na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek: Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

**Środki ostrożności:**

Należy unikać kontaktu produktu z oczami oraz błonami śluzowymi. W przypadku, gdy do takiego kontaktu dojdzie należy przepłukać gałkę oczną lub błonę śluzową, na którą został podany produkt dużą ilością wody.

Kwas salicylowy może zmieniać przepuszczalność skóry dla innych stosowanych jednocześnie substancji, dlatego należy unikać podawania innych leków, kosmetyków itp. na skórę leczoną tym produktem.

W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, pieczenia lub świądu skóry, na którą podano produkt należy przerwać jego stosowanie.

Produkt zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry.

**Prowadzenie pojazdów:**

Polfungicid nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

**Przedawkowanie:**

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania produktu.

W razie przypadkowego lub omyłkowego doustnego zażycia produktu Polfungicid należy natychmiast podjąć działania mające na celu usunięcie go z organizmu (wywoływanie wymiotów, płukanie żołądka), należy kontrolować stan równowagi wodnoelektrolitowej, a w razie konieczności wdrożyć leczenie objawowe.

**Ciąża:**

Z powodu braku dobrze udokumentowanych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania, produkt może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Z powodu braku odpowiednich badań, nie zaleca się stosowania produktu Polfungicid w okresie karmienia piersią.