

Pyrantelum Medana zawiesina doustna 0,25g/5ml 15 ml



Nasza cena: 19,80 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,25 g/5ml
Opakowanie	15 ml
Postać	zaw.doust.
Producent	MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Rejestracja	
Substancja czynna	Pyrantelum

Opis produktu

Nazwa: Pyrantelum Medana
Postać: zaw.doust.
Dawka: 0,25 g/5ml
Opakowanie: 15 ml
Skład:

W 5 ml zawiesiny znajduje się 250 mg pyrantelu (Pyrantelum) w postaci embonianu pyrantelu.

Substancje pomocnicze wykazujące działanie biologiczne: sorbitol 70 %.
Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz: punkt 6.1.

Wskazania:

Owsica i glistnica u dzieci lub dorosłych wywołana przez *Enterobius vermicularis* i *Ascaris lumbricoides*. Zakażenie tęgoryjcem dwunastnicy *Ancylostoma duodenale* i tęgoryjcem amerykańskim *Necator americanus*.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie piperazyny.
Unikać stosowania pyrantelu w czasie leczenia miastenii.

Działania niepożądane:

Pyrantelum Medana jest na ogół dobrze tolerowany przez organizm. Stosowany w dawkach leczniczych rzadko powoduje zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak: nudności, wymioty, zaburzenia łaknienia, bóle brzucha, biegunka, podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych. Rzadziej występujące działania niepożądane to: alergiczne wysypki skórne, bóle i zawroty głowy, senność lub bezsenność.

Interakcje:

Może zwiększać stężenie teofiliny w osoczu.

Ze względu na antagonizm działania nie należy stosować preparatu Pyrantelum Medana jednocześnie z piperazyną, gdyż połączenie to prowadzi do osłabienia działania obu leków.

Dawkowanie:

Preparat przyjmuje się doustnie, w czasie lub po posiłku.

Preparat dawkuje się następująco:

w glistnicy wywołanej przez *Ascaris lumbricoides*:

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg: 11 mg/kg mc. jednorazowo. Zazwyczaj wystarczające jest podanie jednorazowe, jednak w przypadku braku skuteczności dawkę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach.

w owsicy wywołanej przez *Enterobius vermicularis*:

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg: 11 mg/kg mc, jednorazowo. Dawkę tę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach.

w zarażeniu tęgoryjcem dwunastnicy (*Ancylosioma duodenaie*) lub tęgoryjcem amerykańskim (*Necator americanus*)

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg: 11 mg/kg mc. raz na dobę przez 3 kolejne dni.

W zależności od masy ciała produkt leczniczy Pyrantelum Medana, zawiesina doustna dawkuje się następująco:

Masa ciała	Dawka jednorazowa (ml)	Dawka jednorazowa (mg)
11-16 kg	2,5 ml	125 mg
17-28 kg	5,0 ml	250 mg
29-39 kg	7,5 ml	375 mg
40-50 kg	10,0 ml	500 mg
51-62 kg	12,5 ml	625 mg
63-75 kg	15,0 ml	750 mg
Dorośli o mc. > 75 kg	20,0 ml	1000 mg

Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką.

Sposób stosowania

Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Nie ma konieczności stosowania środków przeczyszczających przed podaniem preparatu Pyrantelum Medana,

W przypadku rozpoznania owsicy leczeniem należy objąć wszystkich domowników oraz rygorystycznie przestrzegać zasad higieny, aby uniknąć nawrotu infestacji. Po upływie 14 dni od zakończenia leczenia należy wykonać kontrolne badania parazytologiczne.

Środki ostrożności:

Ostrożnie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia. W przypadku zaburzenia czynności wątroby można rozważyć zredukowanie dawki (lek powoduje przemijające zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej AspAT we krwi)

Ze względu na zawartość sorbitolu leku nie należy stosować u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

Prowadzenie pojazdów:

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przedawkowanie:

Nawet po spożyciu dużej dawki, ze względu na małą biodostępność, lek osiąga zazwyczaj niewielkie stężenie w osoczu. Głównymi objawami przedawkowania są zaburzenia żołądkowo - jelitowe, przemijające zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego (znużenie, ból i zawroty głowy) i niekiedy zwiększenie aktywności AspAT we krwi. Nie ma specyficznej odtrutki, może być wskazane płukanie żołądka i (lub) monitorowanie czynności krążenia i oddychania.

Ciąża:

Badania na zwierzętach nie wykazały teratogennego działania embonianu pyrantelu, nie są też znane doniesienia o jego teratogenności u ludzi. Jednak ze względu na brak kontrolowanych badań klinicznych, dotyczących stosowania pyrantelu u kobiet w ciąży, nie zaleca się stosowania tego preparatu w ciąży, z wyjątkiem przypadków, w których przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Nie prowadzono badań dotyczących przenikania embonianu pyrantelu do mleka matki. Z tego powodu nie zaleca się stosować preparatu Pyrantelum Medana u kobiet karmiących piersią.