

Raphacholin forte tabletki 10 szt



Nasza cena: 18,90 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,25 g/tabł.
Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Acidum dehydrocholicum

Opis produktu

Nazwa: Raphacholin forte

Postać: tabl.powl.

Dawka: 0,25 g/tabł.

Opakowanie: 10 tabl.

Skład: 1 tabletkę powlekana zawiera 250 mg kwasu dehydrocholowego

Wskazania:

Lek stosuje się w niedostatecznym wydzielaniu żółci przez wątrobę i niestrawności objawiającej się wzdęciami, bólami brzucha, odbijaniem, nudnościami, zaparciem oraz jako łagodny środek przeczyszczający.

Przeciwwskazania:

Ostre i przewlekłe schorzenia wątroby, ostre stany zapalne w obrębie przewodu pokarmowego, niedrożność dróg żółciowych i przewodu pokarmowego. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Działania niepożądane:

Mogą wystąpić: biegunka, nudności, wymioty oraz inne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. W przypadku nadwrażliwości na składniki leku mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Interakcje:

Dotychczas nie opisano interakcji z innymi lekami.

Dawkowanie:

W przypadku niestrawności: dorośli doustnie 1 tabletkę po jedzeniu, w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 3 tabletek dziennie.

Nie należy przekraczać dawki 6 tabletek (co odpowiada 1,5 g kwasu dehydrocholowego) na dobę.

W przypadku zaparcia: dorośli 2 tabletki jednorazowo.

Efekt przeczyszczający spodziewany jest do 6 godzin.

Środki ostrożności:

Stosowanie w kamicy żółciowej i przewodowej oraz zażywanie leku dłużej niż tydzień należy skonsultować z lekarzem.

Leku nie należy stosować u dzieci.

Prowadzenie pojazdów: Raphacholin Forte nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przedawkowanie:

W przypadku znacznego przedawkowania, wielokrotnie przekraczającego proponowane dawki, może wystąpić efekt przeczyszczający, biegunka oraz nudności i wymioty.

Ciąża:

Nie prowadzono badań na oddziaływanie leku na płód oraz w okresie karmienia piersią.

W związku z tym nie zaleca się stosowania leku w tych okresach.