

## Rivanol 0,1% płyn na skórę 1 mg/g 500 g



Nasza cena: 10,80 pln

### Opis słownikowy

Dawka	1 mg/g
Opakowanie	500 g
Postać	płyn do stos.na skórę
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SP. Z O.O., PATEREK
Rejestracja	
Substancja czynna	Ethacridini lactas

### Opis produktu

**Nazwa:** Rivanol 0,1%  
**Postać:** płyn do stos.na skórę  
**Dawka:** 1 mg/g  
**Opakowanie:** 500 g  
**Skład:**

1 g płynu na skórę zawiera 1 mg etakrydyny mleczanu (*Ethacridini lactas*). Substancje pomocnicze – patrz punkt 6.1

#### Wskazania:

Odkażanie skóry oraz powierzchownych uszkodzeń skóry (np. otarcia naskórka).

#### Przeciwwskazania:

Nie należy stosować produktu leczniczego:

- w nadwrażliwości na etakrydyny mleczan lub barwniki akrydynowe, - doustnie, - do oczu.

#### Działania niepożądane:

Mogą wystąpić odczyny alergiczne.

#### Interakcje:

Należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi produktami leczniczymi stosowanymi miejscowo. Ze względu na ryzyko inaktywacji nie stosować produktu leczniczego ze środkami o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu, nadtlenek wodoru), garbnikami (tanina), substancjami o charakterze anionowym (glikol polietylenowy) oraz z roztworem boranu sodu, kwasu salicylowego, chlorku sodu.

**Dawkowanie:**

Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Rivanol 0,1% stosuje się kilka razy na dobę w postaci okładów, przymoczek i płukań.

**Dzieci**

Brak danych dotyczących stosowania u dzieci.

**Środki ostrożności:**

Nie stosować długotrwale, gdyż produkt leczniczy może spowodować odczyny alergiczne, szczególnie u osób nadwrażliwych.

Należy zaprzestać stosowania, jeśli wystąpią objawy uczulenia.

Nie stosować na duże powierzchnie uszkodzonej skóry. Unikać kontaktu z odzieżą.

**Prowadzenie pojazdów:**

Rivanol 0,1% nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

**Przedawkowanie:**

Nie są dostępne dane dotyczące przedawkowania produktu leczniczego w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

W przypadku omyłkowego wypicia produktu leczniczego, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

**Ciąża:**

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.