

Sachol Żel Stomatologiczny 10 g

Nasza cena: 26,10 pln



Opis słownikowy

Dawka	(0,0871g+0,1mg)/g
Opakowanie	10 g (tuba)
Postać	żel do stos.w jam.ust.
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Cholini salicylas, Cetalkonii chloridum

Opis produktu

Nazwa: Sachol Żel Stomatologiczny

Postać: żel do stos.w jam.ust.

Dawka: (0,0871g+0,1mg)/g

Opakowanie: 10 g (tuba)

Skład: Cholini salicylan 87,1mg, Cetalkoniowy chlorek 0,1mg, Metylu hydroksybenzoesan 1,5mg, Propylu hydroksybenzoesan 0,8mg, podłoże żelowe do 1g.

Działanie: Preparat złożony do stosowania miejscowego w jamie ustnej zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym (salicylan choliny) oraz czwartorzędową pochodną amoniową o działaniu bakteriobójczym na drobnoustroje Gram (+) i Gram (-) (cetalkoniowy chlorek).

Wskazania: Do stosowania miejscowego na śluzówkę jamy ustnej jako lek wspomagający w leczeniu chorób przyzębia, opryszczkowym zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej i innych chorób błon śluzowych przebiegających z odczynem zapalnym, bolesnymi nadżerkami i owrzodzeniami; w leczeniu pleśniawek przewlekłych nawrotowych, pleśniawek wrzodziejących Suttona, opryszczce zwykłej nawrotowej, postaci nadżerkowej liszaja Wilsona, zapaleniu gruczołowym warg, rumieniu wielopostaciowym wysiękowym jamy ustnej. Może być stosowany przy zapaleniu błon śluzowych u osób noszących protezy zębowe, w zapaleniach alergicznych, jako lek wspomagający w leczeniu zespołu Stevensa-Johnsona oraz w leczeniu miejscowym zmian popromiennych po radioterapii nowotworów

Przeciwwskazania: - nadwrażliwość na salicylany

Działania niepożądane: - bóle brzucha- reakcje uczuleniowe- nudności

Interakcje: Przy miejscowym stosowaniu leku zgodnie z zaleconym dawkowaniem, nie istnieje ryzyko wystąpienia interakcji. Tylko w przypadku znacznego przedawkowania i wystąpienia objawów ogólnego działania salicylanu choliny należy uwzględnić, że działa on synergicznie z innymi lekami przeciwzapalnymi, przeciwgorączkowymi i przeciwbólowymi.

Dawkowanie: W chorobach błony śluzowej jamy ustnej: w postaci okładów i delikatnego wcierania niewielkiej ilości żelu 2-3 razy dziennie przez kilka minut. W chorobach przyzębia z zapaleniem i/lub patologicznymi kieszonkami przyzębnymi żel wprowadza się do kieszonek, stosuje w formie okładów lub delikatnego wcierania w zapalnie zmienione dziąsła, zazwyczaj 1-2 razy dziennie.

Uwagi: Ze względu na zawartość w preparacie salicylanu choliny - w przeciwwskazaniach należy rozważyć możliwość działania ogólnego.