

Sinecod syrop 100 ml



Nasza cena: 31,50 pln

Opis słownikowy

Dawka	1,5 mg/ml
Opakowanie	100 ml (butelka)
Postać	syrop
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Butamiratum

Opis produktu

Nazwa: Sinecod
Postać: syrop
Dawka: 1,5 mg/ml
Opakowanie: 100 ml (butelka)
Skład:

Jeden ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynian (*Butamirati citras*). Substancje pomocnicze:

Jeden ml syropu zawiera 405 mg sorbitolu i 2,5 mg etanolu 96%.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wskazania:

Objawowe leczenie kaszlu różnego pochodzenia.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na butamiratu cytrynian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane:

Zaburzenia układu nerwowego: Rzadko ($\geq 1/10\ 000$,

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko ($\geq 1/10\ 000$,

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko ($\geq 1/10\ 000$,

Interakcje:

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Ze względu na hamowanie odruchu kaszlu przez butamiratu cytrynian należy unikać jednoczesnego podawania leków wykrztuśnych (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie:

Poniższe zalecenia dotyczące dawkowania oparte są na doświadczeniu; brak danych z odpowiednich badań mających na celu ustalenie dawkowania.

Maksymalny czas trwania leczenia bez zalecenia lekarza wynosi 1 tydzień (patrz punkt 4.4).

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu (7,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu (15 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.
Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.
Dorośli: 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 4 razy na dobę.

Miarkę do dawkowania syropu należy umyć i wysuszyć po każdorazowym użyciu.

Produktu Sinecod w postaci syropu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Środki ostrożności:

Ze względu na hamowanie odruchu kaszlu przez butamiratu cytrynian, należy unikać jednoczesnego podawania leków wykrztuśnych, ponieważ może to prowadzić do zalegania śluzu w drogach oddechowych, co zwiększa ryzyko skurczu oskrzeli i zakażenia dróg oddechowych.

Jeżeli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni, należy zweryfikować diagnozę.

Sinecod, syrop zawiera sorbitol, dlatego nie należy stosować produktu u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu.

Sinecod, syrop zawiera małe ilości etanolu, mniej niż 100 mg na dawkę.

Prowadzenie pojazdów:

Sinecod może wywoływać senność. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych lub wykonywania innych czynności wymagających wzmożonej uwagi (np. obsługiwanie maszyn).

Przedawkowanie:

W wyniku przedawkowania produktu Sinecod mogą wystąpić następujące objawy: senność, nudności, wymioty, biegunka, zawroty głowy i niedociśnienie tętnicze.

W razie przedawkowania należy zastosować typowe postępowanie doraźne, obejmujące płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego, monitorowanie i w razie potrzeby podtrzymywanie czynności życiowych. Nie jest znane specyficzne antidotum.

Ciąża:

Nie prowadzono specjalnych badań mających na celu określenie bezpieczeństwa stosowania produktu w okresie ciąży i laktacji.

Należy unikać stosowania produktu Sinecod w pierwszym trymestrze ciąży. W pozostałych miesiącach ciąży produkt Sinecod może być stosowany tylko w przypadku bezwzględnej konieczności.

Nie wiadomo, czy substancja czynna i (lub) jej metabolity przenikają do mleka matki. Ze względów bezpieczeństwa i zgodnie z ogólną zasadą podawanie butamiratu podczas karmienia piersią powinno być uważnie rozważone.