

Slow-Mag tabletki 60 szt



Nasza cena: 12,51 pln

Opis słownikowy

Dawka	64 mg Mg ²⁺
Opakowanie	60 tabl.
Postać	tabl.dojelit.
Producent	PRODUKCYJNO- HANDL.PRZED.FARMAC.CURTIS HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Magnesii chloridum

Opis produktu

Nazwa: Slow-Mag

Postać: tabl.dojelit.

Dawka: 64 mg Mg²⁺

Opakowanie: 60 tabl.

Skład: Jedna tabletkta zawiera 64 mg jonów magnezu (Magnesium) w postaci magnezu chlorku sześciowodnego. Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

Wskazania: Niedobory magnezu Niedoborom magnezu mogą towarzyszyć: bóle mięśniowe, tiki, drżenia mięśni, bóle głowy, stany zmęczenia, wzmożona drażliwość, zmniejszona odporność na stres, zaburzenia snu, zaburzenia stężenia lipidów w surowicy krwi, zaburzenia rytmu serca, przyspieszone zmiany miażdżycowe naczyń, nadciśnienie tętnicze, przyspieszona osteoporoza. Do zwiększonej utraty magnezu dochodzi także w trakcie przyjmowania leków moczopędnych.

Przeciwwskazania: • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 • Podwyższone stężenie magnezu w surowicy krwi (hipermagnezemia) • Znaczne niedociśnienie tętnicze • Zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego • Niewydolność nerek • Myasthenia gravis.

Działania niepożądane: Możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, między innymi działania przeczyszczającego.

Interakcje: Wchłanianie magnezu z tabletek dojelitowych ograniczają kwasy organiczne, fityna, kwas szczawiowy, kwas galusowy (tanina), kwasy tłuszczowe, oraz fosforany. Wchłanianie magnezu zmniejszają także związki wapnia stosowane w dużych dawkach. Związki magnezu podawane doustnie zmniejszają wchłanianie tetracyklin, fluorochinolonów, związków żelaza i fluoru oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych warfaryny. Leki moczopędne, antybiotyki aminoglikozydowe, cysplatyna, mitramycyna, amfoterycyna B i mineralokortykosteroidy zwiększają wydalanie magnezu w moczu. Równoczesne stosowanie magnezu i amiodaronu może wywołać zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego. Równoczesne stosowanie magnezu i dihidralazyny może wywołać znaczne niedociśnienie krwi.

Dawkowanie: Zapobiegawczo - zwykle 2 tabletki na dobę (1 tabletkta rano i 1 tabletkta wieczorem). W stwierdzonym niedoborze magnezu: - dorośli 6 tabletek na dobę (2 tabletki rano i 4 tabletki wieczorem) przez 3 tygodnie, następnie 3 tabletki wieczorem; - dzieci powyżej 6 lat według zaleceń lekarza. Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania ani dzielenia. Po każdorazowym pobraniu leku pojemnik należy natychmiast szczelnie zamknąć.

Środki ostrożności: Związki magnezu działają przeczyszczająco. Przewlekła biegunka związana z długotrwałym stosowaniem produktów leczniczych zawierających magnez może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej. Podawanie produktu leczniczego

pacjentom z niewydolnością nerek może spowodować hipermagnezemię i zatrucie magnezem. Stosowanie z innymi produktami zawierającymi magnez może prowadzić do nadmiaru magnezu w organizmie.

Prowadzenie pojazdów: Produkt leczniczy w zalecanych dawkach nie wywiera negatywnego wpływu na sprawność fizyczną oraz psychiczną i nie jest przeciwwskazany w czasie wykonywania pracy zawodowej (w tym obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu) oraz podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Przedawkowanie: Nie zgłoszono przypadków przedawkowania.

Ciąża: W zalecanych dawkach produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży i laktacji jedynie na zlecenie lekarza. Hipermagnezemia u ciężarnych kobiet może wpływać na zaburzenie homeostazy wapnia u płodu i noworodka.