

Strepsils Junior 24 szt



Nasza cena: 24,30 pln

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---|
| Dawka | 0,6mg+1,2mg |
| Opakowanie | 24 pastyl. |
| Postać | pastyl.twarde |
| Producent | RECKITT BENCKISER POLAND S.A. |
| Rejestracja | |
| Substancja czynna | Amylmetacresolum, Alkohol 2,4-dichlorobenzyllicus |

Opis produktu

Nazwa: Strepsils Junior
Postać: pastyl.twarde
Dawka: 0,6mg+1,2mg
Opakowanie: 24 pastyl.
Skład:

Jedna pastylka twarda zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego (*Alcohol 2,4dichlorobenzyllicus*) i 0,6 mg amylometakrezolu (*Amylmetacresolum*).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna pastylka twarda zawiera maltitol i izomalt.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wskazania:

Do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane:

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości i bolesność języka.

Interakcje:

Dotychczas nie są znane klinicznie istotne interakcje.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: Jedną pastylkę należy ssać powoli co 2 - 3 godziny. Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę.

Osoby w wieku podeszłym: Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u osób w wieku podeszłym.

Do stosowania doustnego.

Środki ostrożności:

Jeśli objawy utrzymują się, należy zastosować inne leczenie.

Wartość kaloryczna jednej pastylki wynosi 5,5 kcal/23kJ.

Ze względu na zawartość maltitolu i izomaltu, produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Prowadzenie pojazdów:

Nie jest znany wpływ produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przedawkowanie:

Przedawkowanie nie powinno być przyczyną innych zaburzeń niż dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Należy zastosować leczenie objawowe.

Ciąża:

Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu Strepsils Junior w czasie ciąży i karmienia piersią. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność w przypadku zalecania produktu kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.