

Strepsils z naturalnym miodem i cytryną pastylki 24 szt



Nasza cena: 22,50 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,6mg+1,2mg
Opakowanie	24 pastyl.
Postać	pastyl.twarde
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Amylmethacresolum, Alkohol 2,4-dichlorobenzylicus

Opis produktu

Nazwa: Strepsils z natur.miodem i cytryną
Postać: pastyl.twarde
Dawka: 0,6mg+1,2mg
Opakowanie: 24 pastyl.
Skład:

Jedna pastylka twarda zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego (*Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus*) i 0,6 mg amyloetakrezolu (*Amylmetacresolum*) .

Substancje pomocnicze:

Jedna pastylka twarda zawiera 1,4 g syropu z sacharozy, 0,976 g syropu z glukozy i 125,6 mg miodu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wskazania:

Do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane:

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości i bolesność języka.

Interakcje:

Dotychczas nie są znane klinicznie istotne interakcje.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: Jedną pastylkę należy ssać powoli co 2 - 3 godziny.
Osoby w wieku podeszłym: Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u osób w wieku podeszłym.
Do stosowania doustnego.

Środki ostrożności:

Jeśli objawy utrzymują się, należy zastosować inne leczenie.

Ze względu na zawartość glukozy i sacharozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Jedna pastylka zawiera około 1,4 g sacharozy i 0,976 g glukozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Prowadzenie pojazdów: Nie jest znany wpływ preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przedawkowanie:

Przedawkowanie nie powinno być przyczyną innych zaburzeń niż dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Należy zastosować leczenie objawowe.

Ciąża: Nie określono bezpieczeństwa stosowania preparatu Strepsils z miodem i cytryną w czasie ciąży i karmienia piersią. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność w przypadku zalecania preparatu kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.