

Sylicynar tabletki



Nasza cena: 26,91 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,0286g+0,14g
Opakowanie	60 tabl. (4 blist.po 15szt.)
Postać	tabl.powl.
Producent	POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Silibi mariani extractum siccum, Cynarae herba extractum

Opis produktu

Nazwa: Sylicynar

Postać: tabl.powl.

Dawka: 0,0286g+0,14g

Opakowanie: 60 tabl. (4 blist.po 15szt.)

Skład:

1 tabletkę zawiera:

substancje czynne:

- × 140 mg wyciągu suchego z ziela karczocha (*Cynarae herbae extractum*, DER 3 - 7 : 1, ekstrahent: woda),
- × 28,6 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu (*Silybi mariani fructus extractum*, DER 20 - 34 : 1, ekstrahent: metanol 90%),

substancje pomocnicze:

rdzeń: celuloza mikrokrystaliczna, sodowy glikolan skrobi, talk, powidon, stearynian magnezu,

składniki otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, czern brylantowa E151, czerwien koszenilowa E124, żółcień chinolinowa E104.

Wskazania:

Lek *Sylicynar*® stosuje się w stanach po toksycznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin). Wspomagająco znajduje zastosowanie w zaburzeniach czynności wątroby oraz przy podwyższonym stężeniu cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi przy zachowaniu diety niskotłuszczowej.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników lub nadwrażliwość na rośliny z rodziny *Compositae*.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, *Sylicynar®* może powodować działania niepożądane. Dotychczas nie odnotowano działań niepożądanych po zastosowaniu produktu leczniczego *Sylicynar®*.

Niemniej w trakcie stosowania istnieje możliwość wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych oraz łagodnego działania przeczyszczającego. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Interakcje:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 razy dziennie 2 tabletki po jedzeniu, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Produkt wymaga systematycznego stosowania. Okres terapii należy konsultować z lekarzem.

Dawkowanie (dzieci):

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Środki ostrożności:

Przeciwwskazaniem do stosowania leku *Sylicynar®* jest niedrożność dróg żółciowych.

W przypadku kamicy żółciowej należy przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem. Podczas terapii i po jej zakończeniu należy unikać środków szkodliwych dla wątroby.

Prowadzenie pojazdów:

Stosowanie preparatu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn w ruchu.

Przedawkowanie:

Brak danych o objawach przedawkowania.

Ciąża:

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży.

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania preparatu w czasie karmienia piersią.

Uwagi:

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

*Nie należy stosować leku *Sylicynar®* po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.*