

# Tymsal Spray aerozol doustny



Nasza cena: 20,70 pln

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 ml (butelka)
Postać	aer.do st.w j.ustnej
Producent	KRAKOWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" W KRAKOWIE S.A.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	-

## Opis produktu

**Nazwa:** Tymsal Spray  
**Postać:** aer.do st.w j.ustnej  
**Dawka:** -  
**Opakowanie:** 30 g  
**Skład:**

Możliwe jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości, objawiających się m.in. dusznością, pokrzywką i miejscowymi obrzękami.

### Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl @urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

### **Interakcje:**

Dotychczas nie są znane.

### **Dawkowanie:**

#### Dawkowanie

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Lek rozpylać w jamie ustnej 2- krotnie, 3 razy na dobę.

Dzieci:

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

**Czas stosowania:**

Nie stosować dłużej niż tydzień bez wskazań lekarskich. Po tygodniu, w przypadku utrzymania się dolegliwości należy zwrócić się o poradę do lekarza.

**Środki ostrożności:**

Jeśli objawy się nasilą, nie ustąpią albo towarzyszyć im będzie duszność lub gorączka należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku dostania się leku do oczu przemyć wodą i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Uwaga: Lek zawiera etanol.

**Prowadzenie pojazdów:**

W zalecanym sposobie użycia produkt nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

**Przedawkowanie:**

Przypadki przedawkowania nie są znane.

**Ciąża:**

Brak danych na temat wpływu na płodność.

Przez wzgląd na brak danych i potencjalne ryzyko nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia.