

Upsarin C tabletki musujące



Nasza cena: 10,71 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,33g+0,2g
Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabl.mus.
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum, Acidum ascorbicum

Opis produktu

Nazwa: Upsarin C
Postać: tabl.mus.
Dawka: 0,33g+0,2g
Opakowanie: 10 tabl.
Wskazania:

Wskazania do stosowania:

Stosowany w stanach grypowych, przeziębieniach, gorączce, bólach głowy, bólach stawów, mięśni, nerwobólach, bólach miesiączkowych. Bólach reumatycznych, bólach zęba. Kwas acetylosalicylowy zalecany jest też do zwalczania bólu w przebiegu chorób nowotworowych.

Dawkowanie:

Zwykle dorośli przyjmują 1-2 tabletki 2-3 razy dziennie. Należy uważać aby nie przekroczyć dawki 8 tabletek na dobę. W bólach reumatycznych dawkę można podwoić. Dzieci w 1 roku życia - maksymalnie 1-1/2 tabletki na dobę. Dzieci powyżej 3 lat zwykle 1/2-1 tabletki (nie więcej niż 1 tabletki), 2-3 razy dziennie. Jednak stosowanie preparatów z kwasem acetylosalicylowym nie jest zalecane u dzieci poniżej 12 roku życia w przebiegu chorób gorączkowych (zwłaszcza ospy wietrznej i grypy). Tabletkę należy rozpuścić w 1/2 szklanki letniej wody i następnie wypić jeszcze musujący płyn. Unikaj stosowania tego preparatu dłużej niż 10 dni.