

Urosal tabletki 20 szt



Nasza cena: 26,10 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,3g+0,3g
Opakowanie	20 tabl. (fiol.)
Postać	tabl.
Producent	VIS - ZAKŁADY CHEMICZNO - FARMACEUTYCZNE SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Methenaminum, Phenylum salicylicum

Opis produktu

Nazwa: Urosal
Postać: tabl.
Dawka: 0,3g+0,3g
Opakowanie: 20 tabl. (fiol.)
Skład:

1 tabletkę zawiera *Methenaminum* (metenamina) i *Phenylis salicylas* (fenylu salicylan) oraz laktozę jednowodną i sacharozę, substancje pomocnicze biologicznie czynne. Substancje pomocnicze, patrz pkt 6.1.

Działanie: - odkażająco i przeciwbakteryjnie,- hamuje nadmierne procesy fermentacyjne.

Wskazania:

Urosal jest stosowany w zapaleniu pęcherza moczowego, w odmiedniczkowym zapaleniu nerek, zapaleniu miedniczek nerkowych, stanach zapalnych pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, w biegunce, nieżyście jelit.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na salicylany i fenol, niewydolność nerek, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, skaza krwotoczna, ciężka niewydolność choroby, znacznego stopnia kwasica metaboliczna, odwodnienie.

Działania niepożądane:

Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, skórne odczyny alergiczne, bóle brzucha, krwinkomocz, trombocytopenia, leukopenia, niedokrwistość. Rzadko może wystąpić podrażnienie jelit i dróg moczowych, co może powodować ból w czasie oddawania moczu, pieczenie i uczucie parcia na mocz.

Interakcje:

Nie stosować z sulfonamidami. Z uwagi na zawartość salicylanów, lek działa synergicznie z innymi lekami przeciwzakrzepowymi, przeciwgorączkowymi, mogącymi wpływać niekorzystnie na przewod pokarmowy i układ krwiotwórczy. W przypadku leków przeciwzakrzepowych interakcja ta może powodować wystąpienie krwawień.

Dawkowanie:

Doustnie: 3 razy dobowo po 1 tabletkę po jedzeniu, popijając wodą.

Środki ostrożności:

W przypadku astmy oskrzelowej stosować po konsultacji z lekarzem. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy i fruktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub niedoborem sacharazy-izomaltazy albo zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy.

Prowadzenie pojazdów:

Preparat nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przedawkowanie:

4.9. Przedawkowanie Brak danych.

Ciąża:

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.