

## Urosan fix x 20



Nasza cena: 9,00 pln

### Opis słownikowy

Dawka	2 g
Opakowanie	20 toreb.
Postać	zioła do zaparz.w saszet.
Producent	HERBAPOL-LUBLIN S.A.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Mieszanka ziołowa

### Opis produktu

**Nazwa:** Urosan

**Postać:** zioła do zaparz.w saszet.

**Dawka:** 2 g

**Opakowanie:** 20 toreb.

**Skład:**

1 saszetka 2,0 g zawiera:

Ziele skrzypu (*Equiseti herba*) 0,8 g

Liść brzozy (*Betulae folium*) 0,7 g

Korzeń podróżnika (*Cichorii radix*) 0,3 g

Liść borówki brusznicy (*Vitis idaeae folium*) 0,2 g

### 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zioła do zaparzania, w saszetkach.

**Działanie:** Moczopędnie.

**Wskazania:**

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany:

- pomocniczo w łagodnych zaburzeniach układu moczowego, jako środek zwiększający diurezę w celu przepłukania dróg moczowych

- pomocniczo w łagodzeniu dolegliwości dróg moczowych, takich jak uczucie pieczenia

podczas oddawania moczu i/lub częste oddawanie moczu

#### **Przeciwwskazania:**

Uczulenie na składniki roślin z rodziny *Asteraceae* (*Compositae*) lub pyłek brzozy. Choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy. Nie stosować jeśli konieczne jest zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów (np. ciężkie choroby serca lub nerek).

#### **Działania niepożądane:**

Zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka) i reakcje alergiczne (świąd, wysypka, pokrzywka, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa). Nie jest znana częstotliwość występowania. Ze względu na zawartość związków goryczowych u osób nadwrażliwych mogą wystąpić dolegliwości żołądkowe związane z nadkwaśnością. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

#### **Interakcje:**

Nieznane.

#### **Dawkowanie:**

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2 saszetki ziół zalać 1 szklanką wrzącej wody, naparzać pod przykryciem przez ok. 10-15 min. Pić 3 razy dziennie po 1 szklance ciepłego, świeżo przygotowanego naparu. Stosować przez okres 2-4 tygodni. Podczas stosowania leku zaleca się zwiększenie ilości przyjmowanych płynów.

#### **Środki ostrożności:**

Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej. W przypadku kamicy dróg żółciowych stosować lek tylko po konsultacji z lekarzem. Jeśli w trakcie stosowania produktu pojawią się objawy t.j.: gorączka, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, bóle kurczowe lub krwimocz, należy skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania leku u osób z obrzękami (najczęściej kończyn dolnych) spowodowanymi niewydolnością serca lub nerek. Nie stosować leku dłużej niż przez okres 2-4 tygodni.

#### **Prowadzenie pojazdów:**

Brak danych.

#### **Przedawkowanie:**

W przypadku przedawkowania leku można rozważyć suplementację witaminą B<sub>1</sub> po uprzedniej konsultacji z lekarzem.

#### **Ciąża:**

Bezpieczeństwo stosowania w trakcie ciąży lub laktacji nie zostało ustalone. Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży lub karmienia piersią nie zaleca się przyjmowania w tym okresie.