

Venożel żel 50 g

Nasza cena: 26,10 pln



Opis słownikowy

Dawka	(0,012g+0,01g+5mg)/g
Opakowanie	50 g (tuba)
Postać	żel
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Diclofenacum natricum, Tribenosidum, Escin

Opis produktu

Nazwa: Venożel

Postać: żel

Opakowanie: 50 g

Skład: 1 g żelu zawiera 12 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacumnatricum), 10 mg trybenozydu (Tribenosidum), 5 mg escyny (Escinum) i substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek i wodę oczyszczoną.

Działanie: Venożel to lek stosowany przy obrzękach, bólu i stanie zapalnym żył nóg. Wskazany także w pourazowych bólach mięśni i stawów. Jest to żel o potrójnym działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym.

Wskazania: Venożel jest lekiem, zawierającym aż 3 substancje czynne: diklofenak, trybenozyd i escynę. Dzięki temu, po podaniu na skórę, działa silnie przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Escyna wykazuje działanie przeciwobrzękowe i uszczelniające śródbłonek naczyń krwionośnych.

Venożel to idealny lek dla osób cierpiących na obrzęki i bóle nóg, zapalenie żył kończyn dolnych, jak również obrzęki pooperacyjne. Żel przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwobrzękowy należy delikatnie wmasować w miejsca zmienione chorobowo.

- Venożel ma szerokie spektrum działania dzięki zawartości aż 3 substancji czynnych.
- Potrójny mechanizm działania: przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwobrzękowy.
- Przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 12-ego roku życia.

Wskazania do stosowania leku Venożel:

- zapalenia żył kończyn dolnych,
- obrzęki pooperacyjne i pourazowe, obrzęki zastoinowe kończyn dolnych,
- zespoły bólowe związane z chorobami kręgosłupa,
- pourazowy ból mięśni i stawów (stłuczenia, zwichnięcia, naderwania),
- ograniczone i łagodne postaci zapalenia stawów.

Przeciwwskazania: Kiedy nie stosować leku Venożel:• jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników leku,• w przypadku uszkodzeń, zmian zapalnych skóry oraz otwartych ran,• w ostatnich trzech miesiącach ciąży i w okresie karmienia piersią,• przy występowaniu napadów astmy, pokrzywki lub ostrych nieżytów nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Dawkowanie: Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub

farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Venożel należy stosować miejscowo na skórę, 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych. Ilość użytego żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. Najczęściej zaleca się jednorazowo zastosować pasek żelu o długości około 4 cm. Po nałożeniu żel należy rozprowadzić i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, jeśli leczenie ich nie dotyczy. Czas trwania leczenia zależy od rodzaju zmian chorobowych oraz od reakcji na leczenie. Zwykle leczenie trwa nie dłużej niż kilka tygodni (najczęściej do 4 tygodni). W przypadku braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia się objawów chorobowych, zaleca się kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania żelu.