

Vidisic żel do oczu 10 g



Nasza cena: 30,60 pln

Opis słownikowy

Dawka	2 mg/g
Opakowanie	10 g (tuba)
Postać	żel do oczu
Producent	DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH
Rejestracja	
Substancja czynna	Carbomerum

Opis produktu

Nazwa: Vidisic
Postać: żel do oczu
Dawka: 2 mg/g
Opakowanie: 10 g (tuba)
Skład:

1 g żelu do oczu zawiera 2 mg karbomeru (*Carbomerum*) (lepkość 40,000-60,000 mPa?s)

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

Uwaga:

Lepkość określona w punkcie 2 jest ustalana zgodnie z wymaganiami i odnosi się do substancji czynnej (karbomer) produktu. Lepkość produktu Vidisic wynosi 3,8000-5,600 mPa?s

Działanie:

Żel o bardzo długim czasie działania. Preparat, którego lepkości wynosi ok. 4500 mPas, zbudowany jest z trójwymiarowego szkieletu kwasu poliakrylowego, w którym zamknięta jest woda. Po zakropleniu preparatu, w momencie zamykania powiek następuje uwolnienie pewnej ilości cząsteczek wody; z chwilą otwierania powiek struktura szkieletu kwasu akrylowego ulega odtworzeniu z jednoczesnym wbudowaniem cząsteczek wody.

Wskazania:

Objawowe leczenie suchego zapalenia rogówki i spojówek.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane:

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne na jeden ze składników. Vidisic zawiera cetrimid jako konserwant, który zwłaszcza stosowany często lub przez długi czas może powodować podrażnienie oka (pieczenie, przekrwienie, uczucie obecności ciała obcego) i może uszkadzać nabłonek rogówki. Dlatego też do długotrwałego leczenia przewlekłego suchego zapalenia rogówki i spojówek powinno się stosować leki nie zawierające konserwantów.

Interakcje:

Nie znane.

Uwaga:

Vidisic może przedłużać czas kontaktu leków stosowanych miejscowo. Jeśli Vidisic jest stosowany z innymi kroplami okulistycznymi, należy zachować 5 minutowy odstęp pomiędzy zastosowaniem leków. Jeśli Vidisic jest stosowany z innymi maściami okulistycznymi, należy zachować 15 minutowy odstęp pomiędzy zastosowaniem obu leków. Vidisic powinien być zawsze stosowany jako ostatni.

Dawkowanie:

Leczenie zespołu suchego oka wymaga indywidualnego dawkowania.

W zależności od ciężkości i nasilenia objawów wkraplać jedną kroplę żelu do worka spojówkowego 3 do 5 razy na dobę lub częściej oraz około 30 minut przed snem.

Należy konsultować się z lekarzem okulistą w trakcie stosowania produktu Vidisic w leczeniu suchego zapalenia rogówki i spojówek, które zazwyczaj wymaga długotrwałego lub ciągłego leczenia.

Środki ostrożności:

Miękkie soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zastosowaniem leku. Można je ponownie założyć po upływie co najmniej 15 minut od wkroplenia żelu Vidisic.

Prowadzenie pojazdów:

Po zastosowaniu do worka spojówkowego produkt ten może zaburzać ostrość widzenia na kilka minut. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn tak długo, jak długo zaburzona jest ostrość widzenia.

Przedawkowanie:

Jakiegolwiek przedawkowanie miejscowe do oka lub przypadkowe przyjęcie doustne nie wywiera szkodliwego wpływu.

Dlatego też intensywne leczenie nie jest wymagane.

Ciąża:

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania karbomeru w czasie ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu), przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3).

Należy zachować ostrożność przepisując lek kobietom w ciąży.

Uwagi:

Przy jednoczesnym stosowaniu innych leków okulistycznych preparat Vidisic należy podawać jako ostatni po upływie 5 min.