

Zoxin-med szampon leczniczy 60 ml

Nasza cena: 20,25 pln



Opis słownikowy

Dawka	0,02 g/ml
Opakowanie	60 ml (butelka)
Postać	szamp.leczn.
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Ketoconazolum

Opis produktu

Nazwa: Zoxin-med
Postać: szamp.leczn.
Dawka: 0,02 g/ml
Opakowanie: 60 ml (butelka)
Skład:

1 ml szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu(*Ketoconazolum*). Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1

Wskazania:

Produkt leczniczy Zoxin-med jest wskazany w profilaktyce i leczeniu miejscowym zakażeń grzybiczych skóry, wywołanych przez drożdżaki z rodzaju *Malassezia*:

- w łupieżu skóry głowy, - w łojotokowym zapaleniu skóry, - w łupieżu pstrym.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na ketokonazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.

Działania niepożądane:

Produkt leczniczy Zoxin-med może powodować miejscowe swędzenie, pieczenie, kontaktowe zapalenie skóry, podrażnienie. Rzadko może wystąpić przetłuszczanie się lub wysuszenie włosów.

Interakcje:

Może wystąpić podrażnienie skóry po zastosowaniu produktu leczniczego Zoxin-med bezpośrednio po długotrwałym, miejscowym leczeniu kortykosteroidami.

W przypadku miejscowego leczenia kortykosteroidami (przed zastosowaniem produktu leczniczego Zoxin-med), w celu uniknięcia nasilenia objawów choroby występującego po zaprzestaniu ich stosowania, wskazane jest stopniowe (przez okres od 2 do 3 tygodni) wycofywanie się z leczenia kortykosteroidami.

Zbyt szybkie odstawianie kortykosteroidów może powodować zaczerwienienie i swędzenie skóry.

Dawkowanie:

Produkt leczniczy do stosowania miejscowego na skórę.

Na zwilżone wodą włosy i skórę nanieść odpowiednią ilość szamponu leczniczego, rozmasować do utworzenia się piany. Spłukać po około 5 minutach.

Włosy można umyć wstępnie zwykłym szamponem.

W łupieżu skóry głowy i łojotokowym zapaleniu skóry:

- leczniczo – 2 razy w tygodniu przez 2 do 4 tygodni. - profilaktycznie – raz na dwa tygodnie.

W łupieżu pstrym:

- leczniczo – raz na dobę przez 5 dni.

- profilaktycznie – przed okresem letnim raz na dobę przez kolejne 3 dni.

Środki ostrożności:

Jeśli wystąpi reakcja nadwrażliwości objawiająca się m.in. zaczerwienieniem oraz swędzeniem skóry w miejscu kontaktu z szamponem, należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego.

Chronić oczy przed kontaktem z produktem, gdyż może wystąpić podrażnienie oka. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy je przemyć dużą ilością wody.

Łojotokowemu zapaleniu skóry i łupieżowi często towarzyszy zwiększone wypadanie włosów. Mogą wystąpić przypadki nasilonego wypadania włosów podczas stosowania produktu leczniczego Zoxinmed.

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu u dzieci.

Produkt leczniczy zawiera czerwień koszenilową, która może powodować reakcje alergiczne.

Prowadzenie pojazdów:

Nie obserwowano niekorzystnego wpływu produktu leczniczego Zoxin-med na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przedawkowanie:

Informacje o przedawkowaniu ketokonazolu są ograniczone. W wyniku znacznego przedawkowania pojawia się ból głowy, zmęczenie i szum w uszach, nudności, wymioty.

Ciąża:

Ketokonazol w postaci szamponu nie przenika do krążenia ogólnego. W badaniach nie stwierdzano przenikania ketokonazolu do płynów ustrojowych, nawet po długotrwałym, zewnętrznym stosowaniu szamponu. Brak badań u kobiet w okresie ciąży.

W okresie ciąży i karmienia piersią produkt leczniczy Zoxin-med może być stosowany w zdecydowanej konieczności.