

## Zoxin-med szampon leczniczy



Nasza cena: 32,40 pln

### Opis słownikowy

Dawka	0,02 g/ml
Opakowanie	100 ml (butelka)
Postać	szamp.leczn.
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Ketoconazolium

### Opis produktu

**Nazwa:** Zoxin-med  
**Postać:** szamp.leczn.  
**Dawka:** 0,02 g/ml  
**Opakowanie:** 100 ml (butelka)  
**Skład:**

1 ml szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu(*Ketoconazolium*). Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1

#### Wskazania:

Produkt leczniczy Zoxin-med jest wskazany w profilaktyce i leczeniu miejscowym zakażeń grzybiczych skóry, wywołanych przez drożdżaki z rodzaju *Malassezia*:

- w łupieżu skóry głowy, - w łojotokowym zapaleniu skóry, - w łupieżu pstrym.

#### Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na ketokonazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.

#### Działania niepożądane:

Produkt leczniczy Zoxin-med może powodować miejscowe swędzenie, pieczenie, kontaktowe zapalenie skóry, podrażnienie. Rzadko może wystąpić przetłuszczenie się lub wysuszenie włosów.

#### Interakcje:

Może wystąpić podrażnienie skóry po zastosowaniu produktu leczniczego Zoxin-med bezpośrednio po długotrwałym, miejscowym leczeniu kortykosteroidami.

W przypadku miejscowego leczenia kortykosteroidami (przed zastosowaniem produktu leczniczego Zoxin-med), w celu uniknięcia nasilenia objawów choroby występującego po zaprzestaniu ich stosowania, wskazane jest stopniowe (przez okres od 2 do 3 tygodni) wycofywanie się z leczenia kortykosteroidami.

Zbyt szybkie odstawianie kortykosteroidów może powodować zaczerwienienie i swędzenie skóry.

**Dawkowanie:**

Produkt leczniczy do stosowania miejscowego na skórę.

Na zwilżone wodą włosy i skórę nanieść odpowiednią ilość szamponu leczniczego, rozmasować do utworzenia się piany. Spłukać po około 5 minutach.

Włosy można umyć wstępnie zwykłym szamponem.

**W łupieżu skóry głowy i łojotokowym zapaleniu skóry:**

- leczniczo – 2 razy w tygodniu przez 2 do 4 tygodni. - profilaktycznie – raz na dwa tygodnie.

**W łupieżu pstrym:**

- leczniczo – raz na dobę przez 5 dni.

- profilaktycznie – przed okresem letnim raz na dobę przez kolejne 3 dni.

**Środki ostrożności:**

Jeśli wystąpi reakcja nadwrażliwości objawiająca się m.in. zaczerwienieniem oraz swędzeniem skóry w miejscu kontaktu z szamponem, należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego.

Chronić oczy przed kontaktem z produktem, gdyż może wystąpić podrażnienie oka. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy je przemyć dużą ilością wody.

Łojotokowemu zapaleniu skóry i łupieżowi często towarzyszy zwiększone wypadanie włosów. Mogą wystąpić przypadki nasilonego wypadania włosów podczas stosowania produktu leczniczego Zoxinmed.

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu u dzieci.

Produkt leczniczy zawiera czerwień koszenilową, która może powodować reakcje alergiczne.

**Prowadzenie pojazdów:**

Nie obserwowano niekorzystnego wpływu produktu leczniczego Zoxin-med na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

**Przedawkowanie:**

Informacje o przedawkowaniu ketokonazolu są ograniczone. W wyniku znacznego przedawkowania pojawia się ból głowy, zmęczenie i szum w uszach, nudności, wymioty.

**Ciąża:**

Ketokonazol w postaci szamponu nie przenika do krążenia ogólnego. W badaniach nie stwierdzano przenikania ketokonazolu do płynów ustrojowych, nawet po długotrwałym, zewnętrznym stosowaniu szamponu. Brak badań u kobiet w okresie ciąży.

W okresie ciąży i karmienia piersią produkt leczniczy Zoxin-med może być stosowany w zdecydowanej konieczności.